

## **Patientvejledning Aclasta**

**Aclasta er et lægemiddel til behandling af knogleskørhed.**

### **Blodprøver**

Inden hver behandling skal der tages blodprøver for at kontrollere lever- og nyrefunktionen samt D-vitamin og calcium.

Svarene må ikke være mere end 4 uger gamle.

### **På dagen for Aclasta:**

Drik venligst 1-2 glas væske før og efter behandlingen. Der måles blodtryk og puls, evt. vægt.

### **Hvordan gives medicinen?**

Medicinen gives i en blodåre i armen over 30 min. Observations tiden er efterfølgende er 20 min.

### **Bivirkninger**

Hyppigste bivirkning er feber og influenzalignende symptomer, som optræder hos 20% ved første infusion, men sjældent ved de næste infusioner.

I de fleste tilfælde er influenzasymptomerne lette og kræver ingen behandling. Symptomerne forsvinder efter 2 – 3 dage.

### **Kommende behandlinger**

Aclasta gives 1 gang årligt i dagenheden, forsøges kombineret med årlig lægekontrol samme dag i ambulatoriet.

### **Supplerende behandling**

Sideløbende med behandlingen skal der suppleres med tablet Calcium med D-vitamin dagligt.

### **Kontroller**

Efter hver Aclasta behandling skal der tages blodprøver 5 uger efter enten på sygehus eller egen læge.