

Patientvejledning til fuldspyt undersøgelse

Lægen har ordineret en fuldspyt undersøgelse, hvilket vil sige at måle den opsamlede spytmængde produceret på 15 minutter, for at afsløre nedsat spytsekretion.

Undersøgelsen varer 15 minutter og er ganske simpel og smertefri.

Undersøgelsen foregår i siddende stilling, De får udleveret et måleglas.

Her i skal De over det næste kvarter opsamle mundvand, det vil sige at De ikke må synke, men mundvandet skal spyttes ud i måleglasset.

Sygeplejersken måler herefter mængden af mundvand/spyt.

Det er vigtigt for undersøgelsesresultatet at De ikke spiser eller drikker (ej heller skyller munden) mindst 1 time før undersøgelsen. De skal holde pause med eventuel medicin som påvirker spytsekretionen, spørg Deres læge.

Har De spørgsmål til undersøgelsen, er De velkommen til at kontakte ambulatoriesygeplejersken på telefon

73 65 40 33

Patientvejledning

Fuldspyt undersøgelse



Denne pjece er udarbejdet af:
Ambulatoriet Kong Christian X's Gighospital
Godkendt af overlæge Vibeke Ringsdal
Juni 2016

Gigt  Kong Christian X's
hospital

Toldbodgade 3 • DK-6300 Gråsten
Telefon +45 73 65 40 00 • Fax +45 73 65 40 90
kcg@gigtforeningen.dk • www.gigtforeningen.dk/graasten