

Patientvejledning til Schirmers test.

Deres læge har ordineret en Schirmers test, hvilket vil sige at måle tåreproduktionen over 5 minutter for at afsløre øjentørhed.

Undersøgelsen foregår i liggende stilling. Sygeplejersken aftørrer den nederste del af øjenranden. Test strimlen som er et lille stykke trækpapier, placeres herefter under den nedtrukne øjenkant, hvor den skal sidde i 5 minutter.

Undersøgelsen er smertefri, men der kan forekomme lidt svien og irritation mens strimlen sidder i øjenkrogen.

Det er vigtigt for undersøgelsesresultatet at De på undersøgelsesdagen ikke benytter øjendråber af nogen art. De skal holde pause med evt. medicin, som påvirker tåreproduktionen, spørg Deres læge.

Har De spørgsmål til undersøgelsen er De velkommen til at kontakte ambulatoriesygeplejersken på telefon 73654033.

Patientvejledning

Schirmers test



Denne pjece er udarbejdet af:
Ambulatoriet Kong Christian X's Gigthospital
Godkendt af overlæge Vibeke Ringsdal
Juni 2016

Gigt  Kong Christian X's
hospital

Toldbodgade 3 • DK-6300 Gråsten
Telefon +45 73 65 40 00 • Fax +45 73 65 40 90
kcg@gigtforeningen.dk • www.gigtforeningen.dk/graasten